Røntgen colon barn
Invaginasjon

Kontrollpanelene skal være pakket inn med plast før undersøkelsen begynner.

Standard innstilling av gjennomlysning:





Ultralyd ved invaginasjon
Før kontrastundersøkelse kan man gjøre ultralyd abdomen. Ved ileocolisk invaginasjon (utgjør over 90%) kan man se en oppfylning som i tverrsnitt måler omkring 2.5 x 3 cm. Oppfylningen er hypoekkoisk med konsentriske ekkorike ringer og markert sentralt ekko.

Indikasjon Spørsmål om invaginasjon

Forsøk på reponering av invaginasjon er **absolutt kontraindisert** ved peritonitt eller fri luft!

Barnet skal ikke gjennomgå tømningsregime før undersøkelsen. Til nyfødte skal det alltid brukes Omnipaque 140.

1. Venstre sideleie
2. Foleykateter i rectum – ballongen blåses opp
3. Rygg- eller mageleie
4. Nates plastres godt sammen for å fiksere kateteret
5. Kontrastposen henges 1 meter høyere enn bordplaten
6. Gjennomlysningsbilder holder, eksponering unødvendig
7. Hvis invaginatet glir lett tilbake fyller man på med kontrast
8. Ved stopp holdes trykket i 3 minutter, deretter legges posen på gulvet slik at kontrasten renner ut igjen
9. Opptil 3 reponeringsforsøk med 3 minutters mellomrom
10. Eventuelt nok et reponeringsforsøk etter ½ til 6 timer
11. Kontrasten skal gå over i tynntarmen
12. Tømningsbilde til slutt for å utelukke reinvaginasjon

K Try / S Weum 17.12.03