Røntgen ØVD barn enkelkontrast



Standard innstilling av gjennomlysning:



Indikasjoner Stenoser
Gastro-oesophageal refluks
Leieanomalier/malrotasjon

Ultralyd ved pylorusstenose
Ved mistanke om pylorusstenose (2-6 uker gamle barn med sprutbrekninger, eventuelt vektnedgang, dehydrering og elektrolyttforstyrrelser) kan man gjerne begynne utredningen med ultralyd. Ventrikkelen skal være væskefylt og barnet liggende litt skrått mot høyre. Funn: Kanallengde overskrider 15-18 mm, veggtykkelsen er over 4 mm og manglende passasje av væsken over i duodenum.

1. Barn under 1½ år skal ha ventrikkelsonde fra pediatrisk poliklinikk, eldre barn vurderes om de kan drikke selv
2. Barn under 4 år undersøkes i ryggleie, armene holdes langs hodet
3. Kontrast til fundus er fylt
4. Barn uten sonde svelger under gjennomlysning for å fremstille oesophagus
5. Projeksjoner og bildetaking varierer med indikasjon, ved mistenkt pylorusstenose tas rett høyre sideleie og RAO (ryggleie med løftet høyre side)
6. For å utelukke malrotasjon må kontrasten følges forbi det Treitzke ligament, eventuelt senbilde for lokalisasjon av colon
7. Refluks fremprovoseres ved fleksjon i hoftene, senket hodeende og eventuelt bruk av bukpresse
8. Eventuell sonde trekkes opp mens man setter kontrast og avbilder oesophagus

K Try / S Weum 18.12.03