Røntgen tynntarm med sonde (dobbelkontrast)



Tynntarm med dobbel kontrast

1. Orienterende gjennomlysning (kontrastmiddel, fri luft, fordeling av tarmgass?)
2. Ved behov gis 10 mg Afipran for å øke peristaltikken
3. Xylocain gel i nesen og spray i svelget
4. Pasienten sitter og bøyer hodet frem mens sonden med mandreng føres inn
5. Svelger flere ganger når sonden kommer ned i halsen
6. Ryggleie og gjennomlysning
7. Sonden med mandreng manøvreres ut gjennom pylorus
8. Mandrengen trekkes tilbake og sonden føres frem til Treitz' ligament
9. Kontrollerer med kontrastmiddel at sonden er på rett sted
10. Setter resten av kontrastmiddelet (ca 300 ml)
11. Underveis kontrolleres fordelingen av kontrast med gjennomlysning
12. **Bilde 1:** Fylningsbilde jejenum (enkel kontrast)
13. Setter metylcellulose 500-1500 ml (avhengig av tarmens lengde)
14. **Bilde 2 og 3:** Jejenum, ileum og coecum (dobbel kontrast)
15. **Bilde 4 og 5:** Mage-, skrå-, side- eller ryggleie for fullstendig oversikt
16. Bruk om nødvendig kompresjon for å skille tarmslyngene fra hverandre
17. Undersøk peristaltikken under gjennomlysning
18. Kontroller kontrastovergang fra distale ileum til coecum
19. **Bilde 6:** Distale ileum og coecum friprojisert

S Weum 22.01.02