Røntgen ventrikkel og duodenum med dobbelkontrast



A. Ventrikkel med dobbel kontrast

1. Ryggleie, eventuelt senket fotende.
2. En spiseskje "bruspulver", skyller ned med en munnfull vann, unngå raping
3. I venstre sideleie svelges 60-120 ml kontrast
4. Roterer via mageleie til 45º høyre sideleie
5. Tilbake til ryggleie via mageleie og venstre sideleie (fordeler kontrasten)
6. **Bilde 1:** Ryggleie (kontrast i fundus, luft i corpus og canalis)
7. **Bilde 2:** Roter 45º mot venstre (*RAO* – kontrast langs curvatura major)
8. **Bilde 3:** Venstre sideleie (viser ventrale og dorsale begrensning av ventrikkelen)
9. **Bilde 4:** Roter 45º mot venstre (*RPO* – viser fundus med luft og ostium cardiacum)
10. **Bilde 5:** Mageleie
11. **Bilde 6:** Roter 45º mot venstre (*LPO* – viser ostium cardiacum)
12. **Bilde 7:** Høyre sideleie (viser dorsale begrensning av ventrikkelen)
13. **Bilde 8:** Roter 45º mot venstre (*LAO* - viser fundus, pylorus, proksimale duodenum)

B. Bulbus duodeni og duodenum

1. Venstre side løftet (*LAO*), roter tilbake til høyre sideleie i gjennomlysning
2. **Ta bilder** under rotasjonen (viser pylorus og bulbus)
3. Tilbake til ryggleie og løft opp høyre side (*RAO* - friprojiserer duodenum)
4. **Ta bilder** av duodenum helt opp til det Treitzke ligament

C. Stående bilder av fundus ventriculi

1. Stående rotert 45º mot venstre – **ta bilde**
2. Stående rotert 45º mot høyre – **ta bilde**
3. Eventuelle bilder av oesophagus i samme projeksjoner (se egen prosedyre)

K Try / S Weum 03.06.04